

カルボプラチン(day1)(AUC6) + パクリタキセル(day1)(200mg/m<sup>2</sup>)  
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

day1: レスタミン5錠服用

生食100ml day1: グラニセトロンゼリー服用

ファモチジン20mg1AP day1: アプレピタント125mg服用

デキサート3.3mg3AP 30分で day2~3: アプレピタント80mg服用

生食100ml 30分で(アレルギーを抑える薬が効くのを待つ)

生食500ml  
パクリタキセル 3時間で

生食250ml  
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

カルボプラチン(day1)(AUC5)+パクリタキセル(day1, 8)(100mg/m<sup>2</sup>)

1日目

生食100ml

血管確保

day1: レスタミン5錠服用

生食100ml

day1: グラニセトロンゼリー服用

ファモチジン20mg

day1: アプレピタント125mg服用

デキサート9.9mg

day2~3: アプレピタント80mg服用

30分で

生食100ml

30分で

生食250ml

パクリタキセル

60分で

生食250ml

カルボプラチン

60分で

生食50ml

流し

8日目

生食100ml

day8: レスタミン5錠服用

生食100ml

ファモチジン20mg

デキサート6.6mg

生食100ml

生食250ml

パクリタキセル

生食50ml

カルボプラチン(AUC2) + パクリタキセル(40mg/m<sup>2</sup>) + RT

1日目 [1回/週 + (2Gy × 5回/週)] × 6W

生食100ml 血管確保

day1: レスタミン5錠服用

生食100ml day1: グラニセトロンゼリー服用

ファモチジン20mg

デキサート6.6mg

30分で

生食100ml

30分で

生食250ml

パクリタキセル 60分で

生食250ml

カルボプラチン 60分で

生食50ml

流し