

カルボプラチン(day1)(AUC5)+パクリタキセル(day1, 8, 15)(80mg/m²)
1日目

生食100ml 血管を確保する

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml 点滴ラインを流す

グラニセトロン
ファモチジン20mg
デキサート9.9mg
30分で

生食100ml
30分で

生食250ml
パクリタキセル 60分で

生食250ml
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

+ キイトルーダ
8日目, 15日目

生食100ml

レスタミン5錠服用

生食100ml
ファモチジン20mg
デキサート6.6mg
30分で

生食100ml
30分で

生食250ml
パクリタキセル
60分で

生食50ml

カルボプラチン(1, 8, 15)(AUC1.5)+パクリタキセル(1, 8, 15)(80mg/m²)
1日目

生食100ml 血管を確保する

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml 点滴ラインを流す
day1: レスタミン5錠服用

グラニセトロン
ファモチジン20mg
デキサート6.6mg
30分で

生食100ml
30分で

生食250ml
パクリタキセル 60分で

生食250ml
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

+ キイトルーダ
8日目, 15日目

生食100ml

レスタミン5錠服用

グラニセトロン
ファモチジン20mg
デキサート6.6mg
30分で

生食100ml
30分で

生食250ml
パクリタキセル
60分で

生食50ml

生食250ml
カルボプラチン
60分で

生食50ml
流し