

ゲムシタビン(1, 8, 15)(1000mg/m²) + シスプラチン(2)(70mg/m²)

28日周期

1日目

生食100ml

血管確保

1日かけて1000ml以上の水分を取ってください。

生食100ml
デキサート3.3mg2AP

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食100ml

流し

ヘパリンロック

1日目, 8日目, 15日目

2日目

生食500ml

60分

生食500ml

60分

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg3AP

30分で

アプレピタントカプセルを服用(3日間)

生食500ml
10%塩化ナトリウム
シスプラチン

120分で

フロセミド20mg0.5AP

静注

生食500ml

120分で

生食500ml

120分で

生食500ml

120分で

ゲムシタビン(1, 8, 15)(1000mg/m²) + シスプラチン(2)(70mg/m²)

21日周期

1日目

生食100ml

血管確保

1日かけて1000ml以上の水分を取ってください。

生食100ml
デキサート3.3mg2AP

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食100ml

流し

ヘパリンロック

1日目, 8日目

2日目

生食500ml

60分

生食500ml

60分

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg3AP

30分で

アプレピタントカプセルを服用(3日間)

生食500ml
10%塩化ナトリウム
シスプラチン

120分で

フロセミド20mg0.5AP

静注

生食500ml

120分で

生食500ml

120分で

生食500ml

120分で