

FOLFOX(1)+セツキシマブ(1.8)

14日周期

1日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

グラニセトロン3mg
デキサート6.6mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
セツキシマブ 初回120分
(400mg/m²)
2回目以降60分
(250mg/m²)

生食100ml 60分で経過観察

5%ブドウ糖250ml
オキサリプラチン
(85mg/m²) 同時に
120分で 5%ブドウ糖250ml
レボホリナート
(200mg/m²)

生食50ml 全開で
5-FU(400mg/m²)

生食50ml ラインを流す

生食230ml
5-FU ポンプで
(2400mg/m²) 46時間かけて

8日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

生食100ml
デキサート1.65mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
セツキシマブ 60分で

生食100ml 60分で経過観察

FOLFOX(1)+セツキシマブ(1)

14日周期

1日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

グラニセトロン3mg
デキサート6.6mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml 120分で
セツキシマブ (500mg/m²)

生食100ml 60分で経過観察

5%ブドウ糖250ml
オキサリプラチン (85mg/m²) 同時に
120分で 5%ブドウ糖250ml
レボホリナート
(200mg/m²)

生食50ml 全開で
5-FU(400mg/m²)

生食50ml ラインを流す

生食230ml ポンプで
5-FU 46時間かけて
(2400mg/m²)