

ガザイバ+CPA+ADR+VCR+PSL

1サイクル ガザイバ(1, 8, 15)(1000mg/body)+CPA(day1)(750mg/m²)
+ADR(day1)(50mg/m²)+VCR(day1)(1.4mg/m²)+PSL(day1~5)

21日周期

1日目

生食50ml
ポララミン5mg1AP

解熱鎮痛剤服用
30分で ※ガザイバ投与開始
60分前までにPSL内服

生食210ml
ガザイバ

約4時間16分

グラニセトロン3mg

30分で

生食50ml
ドキシソルビシン

全開で

生食50ml
オンコビン

全開で

生食250ml
エンドキサン

2時間で

生食50ml

ラインを流す

8日目, 15日目

生食50ml
ポララミン5mg1AP

解熱鎮痛剤服用
30分で

生食210ml
ガザイバ

約3時間15分(約94分まで短縮可)

生食50ml

ガザイバ+CPA+ADR+VCR+PSL

2~6サイクル ガザイバ(1)(1000mg/body)+CPA(day1)(750mg/m²)
+ADR(day1)(50mg/m²)+VCR(day1)(1.4mg/m²)+PSL(day1~5)

21日周期

1日目

生食50ml
ポララミン5mg1AP

解熱鎮痛剤服用
30分で ※ガザイバ投与開始
60分前までにPSL内服

生食210ml
ガザイバ

約3時間15分(約94分まで短縮可)

グラニセトロン3mg

30分で

生食50ml
ドキソルビシン

全開で

生食50ml
オンコビン

全開で

生食250ml
エンドキサン

2時間で

生食50ml

ラインを流す

ガザイバ+CPA+ADR+VCR+PSL

7, 8サイクル ガザイバ(1)(1000mg/body)

21日周期

1日目

生食50ml ポララミン5mg1AP	解熱鎮痛剤服用 30分で
-----------------------	-----------------

生食210ml ガザイバ	約3時間15分(約94分まで短縮可)
-----------------	--------------------

生食50ml	ラインを流す
--------	--------

ガザイバ+CPA+ADR+VCR+PSL

9サイクル以降(維持療法) ガザイバ(1)(1000mg/body)

2ヵ月周期

1日目

生食50ml ポララミン5mg1AP	解熱鎮痛剤服用 30分で
-----------------------	-----------------

生食210ml ガザイバ	約3時間15分(約94分まで短縮可)
-----------------	--------------------

生食50ml	ラインを流す
--------	--------