

カルボプラチン(AUC5) + ペメトレキセド(500mg/m²) + キイトルーダ

初回

21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml
デキサート9.9mg 30分で
day1: グラニセロンゼリー服用
day1: アプレピタント125mg服用
day2~3: アプレピタント80mg服用
パンビタン末服用(1週間前より連日)
1週間前にメコバラミン筋注

生食100ml
ペメトレキセド 10分で

生食250ml
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

カルボプラチン(AUC5) + ペメトレキセド(500mg/m²) + キイトルーダ
2回目以降
21日周期

1日目

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml キイトルーダ200mg	30分で
------------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml メコバラミン2AP デキサート9.9mg	day1: グラニセトロンゼリー服用 day1: アプレピタント125mg服用 day2~3: アプレピタント80mg服用 30分で
------------------------------------	---

パンビタン末服用(連日)

生食100ml ペメトレキセド	10分で
--------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

ペメトレキシド(500mg／m²)＋キイトルーダ

21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml
メコバラミン2AP
デキサート9.9mg

30分で

パンビタン末服用(連日)

生食100ml
ペメトレキシド 10分で

生食50ml 流し