

オブジーボ(day1)(240mg)

1日目

14日周期

生食100ml

 血管確保

生食100ml オブジーボ

 30分で

生食50ml

 流し

オブジーボ(day1)(480mg)

1日目

28日周期

生食100ml

 血管確保

生食100ml オブジーボ

 30分で

生食50ml

 流し

イミフィンジ1500mg/body

1日目

28日周期

生食100ml

 血管確保

生食100ml イミフィンジ

 60分で

生食50ml

 流し

- ・小細胞肺がんCDDP(orCBDCA)+VP+イミフィンジ4コース後の維持療法
- ・非小細胞肺がんCBDCA+nab-PTX+イジユド+イミフィンジ後の維持療法
- ・非小細胞肺がんCCRT後の維持療法(最長1年間)

テセントリク(day1)(1200mg)

1日目

21日周期

生食100ml

 血管確保

生食250ml テセントリク	1回目60分で 2回目30分に短縮可能
-------------------	------------------------

生食50ml

 流し

キイトルーダ (day1) (200mg)

1日目

21日周期

生食100ml

 血管確保

生食100ml キイトルーダ

 30分で

生食50ml

 流し

キイトルーダ (day1) (400mg)

1日目

42日周期

生食100ml

 血管確保

生食100ml キイトルーダ

 30分で

生食50ml

 流し