

カルボプラチン(AUC5) + ペメトレキセド(500mg/m<sup>2</sup>) + テセントリク

初回

21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食250ml  
テセントリク1200mg 60分で

生食50ml 流し

生食100ml  
デキサート9.9mg 30分で  
day1: グラニセロンゼリー服用  
day1: アプレピタント125mg服用  
day2~3: アプレピタント80mg服用  
パンビタン末服用(1週間前より連日)  
1週間前にメコバラミン筋注

生食100ml  
ペメトレキセド 10分で

生食250ml  
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

カルボプラチン(AUC5) + ペメトレキセド(500mg/m<sup>2</sup>) + テセントリク  
2回目以降  
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食250ml  
テセントリク1200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml  
メコバラミン2AP  
デキサート9.9mg 30分で

day1: グラニセトロンゼリー服用

day1: アプレピタント125mg服用

day2~3: アプレピタント80mg服用

パンビタン末服用(連日)

生食100ml  
ペメトレキセド 10分で

生食250ml  
カルボプラチン 60分で

生食50ml 流し

ペメトレキセド(500mg/m<sup>2</sup>) + テセントリク

21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食250ml  
テセントリク1200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml  
メコバラミン2AP  
デキサート9.9mg

30分で

パンビタン末服用(連日)

生食100ml  
ペメトレキセド 10分で

生食50ml 流し