

オプジーボ(day1)(240mg)

1日目

14日周期

生食100ml 血管確保

生食100ml
オプジーボ 30分で

生食50ml 流し

オプジーボ(day1)(480mg)

1日目

28日周期

生食100ml 血管確保

生食100ml
オプジーボ 30分で

生食50ml 流し

イミフィンジ1500mg／body

1日目

28日周期

生食100ml 血管確保

生食100ml
イミフィンジ 60分で

生食50ml 流し

- ・小細胞肺がんCDDP(orCBDCA) + VP + イミフィンジ4コース後の維持療法
- ・非小細胞肺がんCBDCA + nab-PTX + イジュド + イミフィンジ後の維持療法
- ・非小細胞肺がんCCRT後の維持療法(最長1年間)
- ・小細胞肺がんCCRT後の維持療法(最長2年間)

テセントリク(day1)(1200mg)

1日目

21日周期

生食100ml 血管確保

生食250ml 1回目60分で
テセントリク 2回目30分に短縮可能

生食50ml 流し

テセントリク(day1)(1680mg)

1日目

28日周期

生食100ml 血管確保

生食250ml 1回目60分で
テセントリク 2回目30分に短縮可能

生食50ml 流し

キイトルーダ(day1)(200mg)

1日目

21日周期

生食100ml 血管確保

生食100ml
キイトルーダ 30分で

生食50ml 流し

キイトルーダ(day1)(400mg)

1日目

42日周期

生食100ml 血管確保

生食100ml
キイトルーダ 30分で

生食50ml 流し