

ガザイバ+ベンダムスチン(トレアキシン)

1サイクル ガザイバ(1, 8, 15)(1000mg/body)+ベンダムスチン(1, 2)(90mg/m²)

28日周期

1日目

生食100ml
プレドニン80mg 30分で

生食50ml
ポララミン5mg1AP 解熱鎮痛剤服用
30分で

生食210ml
ガザイバ 約4時間16分

グラニセトロン3mg 30分で

生食250ml(50ml)
ベンダムスチン 60分(10分)で

生食50ml ラインを流す

2日目

生食20ml ライン確認用

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg2AP
(アプレピタント併用時は1AP) 30分で

生食250ml(50ml)
ベンダムスチン 60分(10分)で

生食50ml

8日目, 15日目

生食50ml
ポララミン5mg1AP 解熱鎮痛剤服用
30分で

生食210ml
ガザイバ 約3時間15分(約94分まで短縮可)

生食50ml

ガザイバ+ベンダムスチン(トリアキシン)

2~6サイクル ガザイバ(1)(1000mg/body)+ベンダムスチン(1, 2)(90mg/m²)

28日周期

1日目

生食50ml
ポララミン5mg1AP
解熱鎮痛剤服用
30分で

生食210ml
ガザイバ
約3時間15分(約94分まで短縮可)

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg2AP
(アプレピタント併用時は1AP)
30分で

生食250ml(50ml)
ベンダムスチン
60分(10分)で

生食50ml
ラインを流す

2日目

生食20ml
ライン確認用

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg2AP
(アプレピタント併用時は1AP)
30分で

生食250ml(50ml)
ベンダムスチン
60分(10分)で

生食50ml

ガザイバ+ベンダムスチン(トレアキシ)

7サイクル以降(維持療法) ガザイバ(1)(1000mg/body)

2ヵ月周期

1日目

生食50ml ポラミン5mg1AP	解熱鎮痛剤服用 30分で
----------------------	-----------------

生食210ml ガザイバ	約3時間15分(約94分まで短縮可)
-----------------	--------------------

生食50ml	ラインを流す
--------	--------