

カルボプラチン(day1)(AUC5)+ペメトレキセド(day1)(500mg/m<sup>2</sup>)+テセントリク(day1)  
初回 21日周期

1日目

生食100ml	血管確保
---------	------

生食250ml テセントリク1200mg	60分で
-------------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アロカリス パロノセトロン デキサート4.95mg	パンビタン末服用(1週間前より連日) 1週間前にメコバラミン筋注 30分で
--	---

生食100ml ペメトレキセド(アリムタ)	10分で
--------------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

カルボプラチン(day1)(AUC5)+ペメトレキセド(day1)(500mg/m<sup>2</sup>)+テセントリク(day1)  
2回目以降  
1日目

21日周期

生食100ml	血管確保
---------	------

生食250ml テセントリク1200mg	30分で
-------------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アロカリス パロノセトロン デキサート4.95mg メコバラミン2AP	パンビタン末服用(連日)    30分で
---	----------------------------------

生食100ml ペメトレキセド(アリムタ)	10分で
--------------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

ペトレキセド(day1)(500mg/m<sup>2</sup>) + テセントリク(day1)  
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食250ml  
テセントリク1200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml パンビタン末服用(連日)  
メコバラミン2AP  
デキサート6.6mg 30分で

生食100ml  
ペトレキセド(アリムタ) 10分で

生食50ml 流し