

ルンスミオ 1コース目 (day1, 8, 15)  
21日周期

1日目

8日目

15日目

生食100ml	血管確保	生食100ml		生食100ml	
ルンスミオ開始1時間前に アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用		ルンスミオ開始1時間前に アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用		ルンスミオ開始1時間前に アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用	
生食50ml デキサート16.5mg	30分で	生食50ml デキサート16.5mg	30分で	生食50ml デキサート16.5mg	30分で
生食50ml	30分で	生食50ml	30分で	生食50ml	30分で
生食100ml ルンスミオ1mg	4時間で	生食100ml ルンスミオ2mg	4時間で	生食250ml ルンスミオ60mg	4時間で
生食50ml	流し	生食50ml		生食50ml	

ルンスミオ 2コース目 (day1)

21日周期

1日目

生食100ml 血管確保  
ルンスミオ開始1時間前に  
アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用

生食50ml  
デキサート16.5mg 30分で

生食50ml 30分で

生食250ml  
ルンスミオ60mg 2～4時間で

生食50ml 流し

ルンスミオ 3～8コース目 (day1)  
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保  
必要時アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用

生食100ml  
ルンスミオ30mg 2時間で

生食100ml 流し

ルンスミオ 9～17コース目※8コース目終了時PR/SDの場合  
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保  
必要時アセトアミノフェン、レスタミンコーワ服用

生食100ml  
ルンスミオ30mg 2時間で

生食100ml 流し