

カルボプラチン(day1)(AUC6)＋アリムタ(day1)(500mg/m²)＋アバスチン15mg/kg
初回

1日目

21日周期

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml デキサート9.9mg	20分で	day1: グラニセトロンゼリー服用 day1: アプレピタント125mg服用 day2～3: アプレピタント80mg服用
-----------------------	------	---

生食100ml アリムタ	10分で	パンビタン末服用(1週間前より連日) 1週間前にメコバラミン筋注
-----------------	------	-------------------------------------

ソルデム3200ml カルボプラチン	60分で
-----------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アバスチン	30分で
------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

カルボプラチン(day1)(AUC6) + アリムタ(day1)(500mg/m²) + アバスチン15mg/kg
2回目以降

1日目

21日周期

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml メコバラミン2AP デキサート9.9mg	20分で	day1: グラニセトロンゼリー服用 day1: アプレピタント125mg服用 day2~3: アプレピタント80mg服用
------------------------------------	------	---

パンビタン末服用(連日)

生食100ml アリムタ	10分で
-----------------	------

ソルデム3200ml カルボプラチン	60分で
-----------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アバスチン	30分で
------------------	------

生食50ml	流し
--------	----