

シスプラチン(day1)(75mg/m²) + 初回
アリムタ(day1)(500mg/m²) + アバスチン(day1)15mg/kg

1日目 21日周期

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml 血管確保

生食100ml day1: グラニセトロンゼリー服用
デキサート9.9mg day1: アプレピタント125mg服用
30分で day2~3: アプレピタント80mg服用
day2~4: デカドロン服用

生食100ml パンビタン末服用(1週間前より連日)
アリムタ 1週間前にメコバラミン筋注
10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml
シスプラチン 90分で

生食50ml
フロセミド0.5ap 全開で(5分くらいで)

生食250ml 55分くらいで

生食500ml 90分で
CDDP投与後の排尿を確認
帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

生食100ml 30分で
アバスチン

生食50ml 流し

シスプラチン(day1)(75mg/m²) + 2回目以降
アリムタ(day1)(500mg/m²) + アバスチン(day1)15mg/kg

1日目

21日周期

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml 血管確保

生食100ml
メコバラミン2AP
デキサート3. 3mg3AP
30分で day1: グラニセトロンゼリー服用
day1: アプレピタント125mg服用
day2~3: アプレピタント80mg服用
day2~4: デカドロン服用
パンビタン末服用(連日)

生食100ml
アリムタ 10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml
シスプラチン 90分で

生食50ml
フロセミド0. 5ap 全開で(5分くらいで)

生食250ml 55分くらいで

生食500ml 90分で
CDDP投与後の排尿を確認
帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

生食100ml 30分で
アバスチン

生食50ml 流し