

シスプラチン(day1)(75mg/m²)+
ペムトレキセド(day1)(500mg/m²)+ベバシズマブ(day1)(15mg/kg)

1日目 21日周期

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml 血管確保

生食100ml day2~4:デカドロン服用
アロカリス パンビタン末服用(1週間前より連日)
パロノセトロン 1週間前にメコバラミン筋注
デキサート9.9mg 30分で

生食100ml
ペムトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml
シスプラチン 90分で

生食50ml
フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml 55分くらいで

生食500ml 90分で
CDDP投与後の排尿を確認
帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

生食100ml 30分で
ベバシズマブ(アバスチン)

生食50ml 流し

シスプラチン(day1)(75mg/m²)+
ペトレキセド(day1)(500mg/m²)+ベバシズマブ(day1)(15mg/kg)

1日目 21日周期

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml 血管確保

生食100ml day2~4:デカドロン服用
アロカリス パンビタン末服用(連日)

パロノセトロン
デキサート9.9mg
メコバラミン2AP 30分で

生食100ml
ペトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml
シスプラチン 90分で

生食50ml
フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml 55分くらいで

生食500ml 90分で
CDDP投与後の排尿を確認

帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

生食100ml 30分で
ベバシズマブ(アバスチン)

生食50ml 流し