

シスプラチン(day1)(75mg/m²) +
ペトレキセド(day1)(500mg/m²) + キイトルーダ 200mg
1日目 初回
朝より開始前に500mlの水分を 21日周期

生食100ml

生食100ml
キイトルーダ 200mg

30分で

生食50ml

生食100ml
デキサート 9. 9mg

30分で

day1: グラニセトロンゼリー服用

day1: アプレピタント 125mg服用

day2~3: アプレピタント 80mg服用

day2~4: デカドロン服用

パンビタン末服用(1週間前より連日)

1週間前にメコバラミン筋注

生食100ml
ペトレキセド

10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム

80分で

生食500ml
シスプラチン

90分で

生食50ml
フロセミド 0. 5ap

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を

シスプラチン(day1)(75mg/m²) +
ペトレキセド(day1)(500mg/m²) + キイトルーダ 200mg
1日目 2回目以降
朝より開始前に500mlの水分を 21日周期

生食100ml

生食100ml

キイトルーダ 200mg 30分で

生食50ml

生食100ml

メコバラミン2AP

デキサート9. 9mg

day1: グラニセロンゼリー服用

day1: アプレピタント125mg服用

day2~3: アプレピタント80mg服用

30分で day2~4: デカドロン服用

パンビタン末服用(連日)

生食100ml

ペトレキセド

10分で

生食500ml

硫酸マグネシウム

80分で

生食500ml

シスプラチン

90分で

生食50ml

フロセミド0. 5ap

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を

ペトレキセド(day1)(500mg/m²)+キイトルーダ200mg
1日目

21日周期

生食100ml

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml

生食100ml
メコバラミン2AP
デキサート9.9mg

30分で パンビタン末服用(連日)

生食100ml
ペトレキセド 10分で

生食50ml 流し