

サークリサ+カiproリス+レナデックス

1サイクル目

サークリサ(day1, 8, 15, 22)+カiproリス(day1, 2, 8, 9, 15, 16)+レナデックス(day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23)  
28日周期

day1, 8, 15

生食100ml 血管確保

生食50ml  
ファモチジン  
ポララミン5mg 15分で  
15分で

生食100ml 45分で

サークリサ  
生食 ※初回: 約2時間14分 10mg/kg  
2回目以降: 約2時間

生食50ml 流し

5%ブドウ糖液100ml day1のみ20mg/m<sup>2</sup>  
カiproリス 30分で day8以降56mg/m<sup>2</sup>

生食50ml 流し

day2, 9, 16

生食50ml 血管確保 レナデックス錠服用

5%ブドウ糖液100ml day2のみ20mg/m<sup>2</sup>  
カiproリス 30分で day9以降56mg/m<sup>2</sup>

生食50ml 流し

day22

生食100ml 血管確保

生食50ml  
ファモチジン  
ポララミン5mg 15分で  
15分で

生食100ml 45分で

サークリサ  
生食 10mg/kg  
※約2時間で

生食50ml 流し

day23

レナデックス錠服用

※上記点滴時間は体重50kgの場合  
体重により点滴時間は異なります

サークリサ+カiproリス+レナデックス

2サイクル目以降

サークリサ(day1, 15)+カiproリス(day1, 2, 8, 9, 15, 16)+レナデックス(day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23)  
28日周期

day1, 15

生食100ml 血管確保

生食50ml カロナール錠、レナデックス錠服用  
ファモチジン  
ポララミン5mg 15分で

生食100ml 45分で

サークリサ ※約2時間 10mg/kg  
生食

生食50ml 流し

5%ブドウ糖液100ml  
カiproリス 30分で 56mg/m<sup>2</sup>

生食50ml 流し

day2, 8, 9, 16

生食50ml 血管確保 レナデックス錠服用 レナデックス錠服用

5%ブドウ糖液100ml  
カiproリス 30分で 56mg/m<sup>2</sup>

生食50ml 流し

day22, 23

※上記点滴時間は体重50kgの場合  
体重により点滴時間は異なります