

カルボプラチン(day1)(AUC5)+ペメトレキセド(day1)(500mg/m²)+キイトルーダ(day1)
初回 21日周期

1日目

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml キイトルーダ200mg	30分で
------------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アロカリス パロノセトロン デキサート4.95mg	パンビタン末服用(1週間前より連日) 1週間前にメコバラミン筋注 30分で
--	---

生食100ml ペメトレキセド(アリムタ)	10分で
--------------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

カルボプラチン(day1)(AUC5) + ペメトレキセド(day1)(500mg/m²) + キイトルーダ(day1)
2回目以降 21日周期

1日目

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml キイトルーダ200mg	30分で
------------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

生食100ml アロカリス パロノセトロン デキサート4.95mg メコバラミン2AP	パンビタン末服用(連日) 30分で
---	----------------------------------

生食100ml ペメトレキセド(アリムタ)	10分で
--------------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

ペトレキセド(day1)(500mg/m²) + キイトルーダ(day1)
21日周期

1日目

生食100ml 血管確保

生食100ml
キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml 流し

生食100ml
デキサート6.6mg
メコバラミン2AP 30分で
パンビタン末服用(連日)

生食100ml
ペトレキセド(アリムタ) 10分で

生食50ml 流し