

シスプラチン(day1)(75mg/m<sup>2</sup>)+  
ペムトレキセド(day1)(500mg/m<sup>2</sup>)+キイトルーダ(day1)(200mg)  
1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

生食100ml

キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml

生食100ml

アロカリス

パロノセトロン

デキサート9.9mg

day2~4:デカドロン服用

パンビタン末服用(1週間前より連日)

1週間前にメコバラミン筋注

30分で

生食100ml

ペムトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml

硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml

シスプラチン 90分で

生食50ml

フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認

帰宅後500ml程度の水分を

シスプラチン(day1)(75mg/m<sup>2</sup>)+  
ペメトレキセド(day1)(500mg/m<sup>2</sup>)+キイトルーダ(day1)(200mg)  
1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

生食100ml

キイトルーダ200mg 30分で

生食50ml

生食100ml

アロカリス

パロノセトロン

デキサート9.9mg

メコバラミン2AP

day2~4:デカドロン服用  
パンビタン末服用(連日)

30分で

生食100ml

ペメトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml

硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml

シスプラチン 90分で

生食50ml

フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を