

エプキンリ 1サイクル目

28日周期

エプキンリ皮下注 0.16mg
 エプキンリ皮下注 0.8mg
 エプキンリ皮下注 48mg
 投与1時間前に
 カロナール、レスタミン
 プレドニゾロン内服
 プレドニゾロン100mg

日	1週目							2週目							3週目							4週目						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
●																												
							●																					
														●									●					
●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			

エプキンリ 2~3サイクル目

28日周期

		1週目							2週目							3週目							4週目						
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	エプキンリ皮下注 48mg	●							●							●							●						
	プレドニゾロン100mg	(●)	(●)	(●)	(●)				(●)	(●)	(●)	(●)			(●)	(●)	(●)	(●)			(●)	(●)	(●)	(●)					

※前回投与後にGrade2~3のサイトカイン放出症候群(CRS)が出現した場合、
Grade2以上のCRSが出現しなくなるまでエプキンリ投与前と投与後3日間プレドニゾロン継続
カロナール、レスタミンはエプキンリ投与前に適宜内服

エプキンリ 4~9サイクル目

28日周期

		1週目							2週目							3週目							4週目						
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	エプキンリ皮下注 48mg	●														●													
	プレドニゾロン100mg	(●)	(●)	(●)	(●)											(●)	(●)	(●)	(●)										

※前回投与後にGrade2~3のサイトカイン放出症候群(CRS)が出現した場合、
 Grade2以上のCRSが出現しなくなるまでエプキンリ投与前と投与後3日間プレドニゾロン継続
 カロナール、レスタミンはエプキンリ投与前に適宜内服

エプキンリ 10サイクル目以降

28日周期

		1週目							2週目							3週目							4週目						
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	エプキンリ皮下注 48mg	●																											
	プレドニゾン100mg	(●)	(●)	(●)	(●)																								

※前回投与後にGrade2～3のサイトカイン放出症候群(CRS)が出現した場合、
Grade2以上のCRSが出現しなくなるまでエプキンリ投与前と投与後3日間プレドニゾン継続
カロナール、レスタミンはエプキンリ投与前に適宜内服