

シスプラチン(day1)(75mg/m²) + ペメトレキセド(day1)(500mg/m²)
初回 21日周期

1日目

朝より開始前に500mlの水分を
生食100ml

血管確保

生食100ml
アロカリス
パロノセトロン
デキサート9. 9mg

day2~4: デカドロン服用
パンビタン末服用(1週間前より連日)
1週間前にメコバラミン筋注
30分で

生食100ml
ペメトレキセド(アリムタ)

10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム

80分で

生食500ml
シスプラチン

90分で

生食50ml
フロセミド10mg

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml
CDDP投与後の排尿を確認
帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

2回目以降

1日目

朝より開始前に500mlの水分を
生食100ml

21日周期

生食100ml
アロカリス
パロノセトロン
デキサート9.9mg
メコバラミン2AP

day2~4: デカドロン服用
パンビタン末服用(連日)

30分で

生食100ml
ペメトレキセド(アリムタ)

10分で

生食500ml
硫酸マグネシウム

80分で

生食500ml
シスプラチニ

90分で

生食50ml
フロセミド10mg

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml
CDDP投与後の排尿を確認
帰宅後に500ml程度
の水分を摂取

90分で