

FOLFIRI(1)+セツキシマブ(1.8)

14日周期

1日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

グラニセトロン3mg
デキサート6.6mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
セツキシマブ 初回120分
(400mg/m²)
2回目以降60分
(250mg/m²)

生食100ml 60分で経過観察

生食250ml
イリノテカン
(150mg/m²) 同時に
120分で 生食250ml
レボホリナート
(200mg/m²)

生食50ml 全開で
5-FU(400mg/m²)

生食50ml ラインを流す

生食230ml
5-FU(2400mg/m²) ポンプで
46時間かけて

8日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

生食100ml
デキサート1.65mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
セツキシマブ 60分で

生食100ml 60分で経過観察

FOLFIRI(1)+セツキシマブ(1)

14日周期

1日目

生食20ml ライン確認

生食100ml

グラニセトロン3mg
デキサート6.6mg レスタミン錠服薬
30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
セツキシマブ 120分で
(500mg/m²)

生食100ml 60分で経過観察

生食250ml
イリノテカン
(150mg/m²) 同時に
120分で 生食250ml
レボホリナート
(200mg/m²)

生食50ml
5-FU(400mg/m²) 全開で

生食50ml ラインを流す

生食230ml
5-FU(2400mg/m²) ポンプで
46時間かけて