

卵巣がん

パクリタキセル(day1) + カルボプラチン(day1) + ベバシズマブ(day1)
21日周期

生食100ml	血管を確保する 1日目: レスタミン錠5錠服用
グラニセトロン3mg ファモチジン20mg デキサート9.9mg	30分で 1日目: アプレピタント125mg服用 2・3日目: アプレピタント80mg服用
生食100ml	30分で(アレルギーを抑える薬が効くのを待つ)
生食500ml パクリタキセル	3時間で (175mg/m ²)
生食250ml カルボプラチン	1時間で (AUC5)
生食50ml	点滴ラインを流す
生食100ml ベバシズマブ(アバスチン)	30分で (15mg/kg)
生食50ml	点滴ラインを流す

子宮頸がん

パクリタキセル(day1) + カルボプラチン(day1) + アバスチン(day1)
21日周期

生食100ml

血管を確保する

1日目: レスタミン錠5錠服用

グラニセトロン3mg

ファモチジン20mg

デキサート9.9mg

30分で 1日目: アプレピタント125mg服用
2・3日目: アプレピタント80mg服用

生食100ml

30分で(アレルギーを抑える薬が効くのを待つ)

生食500ml

パクリタキセル

3時間で
(175mg/m²)

生食250ml

カルボプラチン

1時間で
(AUC5)

生食50ml

点滴ラインを流す

生食100ml

アバスチン

30分で
(15mg/kg)

生食50ml

点滴ラインを流す