

検査日時： 年 月 日() 時 分

氏名： _____

PET/CT 検査 問診票

※医師が診断をするために必要な内容です。可能な限り詳しくお書きください。

1. PET 検査を受けたことはありますか	いいえ	はい (いつ頃)
2. 糖尿病と言われたことはありますか	いいえ	はい
・「はい」の方、現在治療されていますか	いいえ	はい (食事療法のみ, 内服薬, インスリン)
・インスリン使用の方、薬は持効型ですか	いいえ	はい (トリパ, パミル, ラタス, グラビソ)
3. 手術や放射線治療をされたことはありますか	いいえ	はい (手術 , 放射線治療) (詳細)
4. ペースメーカー・除細動器はありますか	いいえ	はい ()
5. 上記4以外に、体内に金属はありますか	いいえ	はい ()
6. インスリンポンプ、持続血糖測定器を使用中です	いいえ	はい (インスリンポンプ、持続血糖測定器) →検査時に外していただきます
7. 検査日前1週間以内に内視鏡検査を受けましたか	いいえ	はい
8. 狭い所は苦手ですか	いいえ	はい
9. 腎機能異常を指摘されたことがありますか	いいえ	はい
10. 喫煙されていますか	吸わない	吸う ・ 止めた
「吸う・止めた」の場合	喫煙歴 (	才から 才まで 約 本/1日)
11. 義歯（取り外せる）はありますか	いいえ	はい
12. (女性の方) 月経はありますか	いいえ	はい 最終月経 月 日～ 月 日
13. (女性の方) 授乳中ですか	いいえ	はい
14. がん治療で抗がん剤やホルモン剤を使用中あるいは使用しましたか	いいえ	はい (内服 . 点滴 . 皮下注射)
・「はい」の方、最後に治療したのはいつ頃ですか ※不明の場合、未記入で構いません		()

〈現在、または過去にかかった病気を教えてください〉

病名	時期	治療中 ・ 完治 ・ 経過観察
病名	時期	治療中 ・ 完治 ・ 経過観察
病名	時期	治療中 ・ 完治 ・ 経過観察
病名	時期	治療中 ・ 完治 ・ 経過観察


〈その他気になること、希望すること等があれば記入してください〉

()

PET/CT 検査を受けられる方へ

PET/CT 検査とは	・放射線を出す検査薬を体内に注射し、その分布を画像化するためにPET/CT 装置で撮影を行います。 ・これにより、がんや炎症の大きさ、場所の特定、転移や治療効果を判定することができる検査です。
検査前に 必ずお読み ください （注意事項が 守られていな いと、検査中 止となることがあります）	・検査 4 時間前から食事はとれません。 ・糖尿病薬は、当日は検査終了まで使用しないでください。 ・下剤は前日夜から検査終了まで使用しないでください。その他の処方薬は通常通り服用可能です。 ・検査日の 1 週間前から当日までの間、バリウム検査はできません。ご注意ください。 ・検査前日（前診療日）の 12～14 時の間に検査室から確認の電話をさせていただきます。連休明けの検査の場合は、連休前に確認の電話をさせていただきます。 ・検査終了後も身体から微量の放射線が出ています。検査後は周囲の方の被ばくを減らすため、人ごみを避けてお帰りいただきます。当日中は、小さいお子様や妊娠している方との接触はお控えください。また、当日の検査終了後に診察や他の検査を受けることはできません。
付き添い が必要と なる方	・お一人でお部屋の移動ができない方、検査時に 30 分間程度あお向け（横向きでも可）で安静にしていられない方は、検査を受けることができません。 ＜車いすで移動する方、歩行に不安がある方＞ ・介助者（ご家族等）の協力があれば移動できる方は、<u>検査終了まで介助可能な付き添いの方が</u>いらっしゃる場合に限り検査可能です。 ※医療従事者は放射線被ばく限度の規定があるため原則介助につくことができません。 ・付き添いの方もわずかな被ばくをしますが、身体に影響があらわれる量ではありません。
必要に応じ てご準備い ただくもの	・所要時間は約 3 時間です。（酸素ボンベを使用中的の方は 3 時間以上連続使用できるものをご用意ください） ・腕時計、ネックレス、ピアス、ヘアピン、入れ歯等の金属類ははずしていただきます。（入れ歯の入れ物をご用意ください） ・検査のために、飲み物（常温水、500ml）をご用意してあります。水分制限のある方は、検査当日お申し出ください。（白湯、冷水、お茶（無糖のもの）がよろしければ、持参していただいても構いません）

当日の PET/CT 検査の流れと注意事項



- 検査終了後も身体から微量の放射線が出ています。検査後から翌日までは人ごみを避けて、乳幼児・小児・妊娠している方との接触はお控えください。
- 検査翌日以降は通常の生活で構いません。
- 体内の検査薬は尿となり排泄されますので、水分を多めに摂ることをおすすめします。
- 授乳中の方は、検査薬注射後 24 時間は授乳をお控えください。