

シスプラチン(day1)(75mg/m²) +
ペトレキセド(day1)(500mg/m²) + イミフィンジ(day1)(1500mg)
1日目(初回)

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

生食100ml

イミフィンジ1500mg 60分で

生食50ml

生食100ml

アロカリス

パロノセトロン

デキサート9.9mg

day2~4: デカドロン服用

パンビタン末服用(1週間前より連日)

1週間前にメコバラミン筋注

30分で

生食100ml

ペトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml

硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml

シスプラチン 90分で

生食50ml

フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を

1日目(2回目以降)

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

生食100ml

イミフィンジ1500mg 60分で

生食50ml

生食100ml

アロカリス

パロノセトロン

デキサート9.9mg

メコバラミン2AP

day2~4:デカドロン服用

パンビタン末服用(連日)

30分で

生食100ml

ペムトレキセド(アリムタ) 10分で

生食500ml

硫酸マグネシウム 80分で

生食500ml

シスプラチン 90分で

生食50ml

フロセミド10mg 全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を