

ゲムシタビン(1, 8, 15)(1000mg/m²) + シスプラチン(2)(70mg/m²)
28日周期

1日目

生食100ml

血管確保

1日かけて1000ml以上の水分を取ってください。

生食100ml
デキサート3.3mg2AP 30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン 30分で

生食100ml 流し

ヘパリンロック

1日目, 8日目, 15日目

2日目

生食500ml 60分

生食500ml 60分

グラニセトロン3mg
デキサート3.3mg3AP 30分で
アプレピタントカプセルを服用(3日間)

生食500ml
10%塩化ナトリウム
シスプラチン 120分で

フロセミド20mg0.5AP 静注

生食500ml 120分で

生食500ml 120分で

生食500ml 120分で

ゲムシタビン(1, 8) (1000mg/m²) + シスプラチン(2) (70mg/m²)

21日周期

1日目

生食100ml

血管確保

1日かけて1000ml以上の水分を取ってください。

生食100ml
デキサート3. 3mg2AP 30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン 30分で

生食100ml 流し

ヘパリンロック

1日目, 8日目

2日目

生食500ml 60分

生食500ml 60分

グラニセトロン3mg
デキサート3. 3mg3AP 30分で
アプレピタントカプセルを服用(3日間)

生食500ml
10%塩化ナトリウム
シスプラチン 120分で

フロセミド20mg0. 5AP 静注

生食500ml 120分で

生食500ml 120分で

生食500ml 120分で

シスプラチン(day1)ゲムシタビン(day1, 8, 15)(1000mg/m²)(70mg/m²) short hydration

28日周期

1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

グラニセトロン3mg
ホスアプレピタント
デキサート9.9mg

day2~4:デカドロン服用

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食500ml
硫酸マグネシウム

60~90分で

生食500ml
シスプラチン

90分で

生食50ml
フロセミド10mg

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を
day2, 3:1日かけて1500ml程度の飲水を

8日目、15日目

生食100ml

生食100ml
デキサート6.6mg

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食50ml

シスプラチン(day1)ゲムシタビン(day1, 8)(1000mg/m²)(70mg/m²) short hyderation

21日周期

1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml

グラニセトロン3mg
ホスアプレピタント
デキサート9.9mg

day2~4:デカドロン服用

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食500ml
硫酸マグネシウム

60~90分で

生食500ml
シスプラチン

90分で

生食50ml
フロセミド10mg

全開で(5分くらいで)

生食250ml

55分くらいで

生食500ml

90分で

CDDP投与後の排尿確認 帰宅後500ml程度の水分を
day2, 3:1日かけて1500ml程度の飲水を

8日目

生食100ml

生食100ml
デキサート6.6mg

30分で

5%ブドウ糖液100ml
ゲムシタビン

30分で

生食50ml