ゲムシタビン(1，8，15)(1000mg／m²)＋シスプラチン(2)(70mg／m²)

28日周期

1日目		2日目	
生食100ml		生食500ml	60分
血管確保 1日かけて1000ml以上の 水分を取ってください。		生食500ml	60分
生食100ml デキサート3．3mg2AP	30分で	グラニセトロン3mg デキサート3．3mg3AP	30分で アプレピタントカプセルを服用(3日間)
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で	生食500ml 10%塩化ナトリウム シスプラチン	120分で
生食100ml	流し	フロセミド20mg0．5AP	静注
ヘパリンロック		生食500ml	120分で
1日目，8日目，15日目		生食500ml	120分で
		生食500ml	120分で

ゲムシタビン(1，8)（1000mg／m²）＋シスプラチン（2）（70mg／m²）

21日周期

1日目		2日目	
生食100ml		生食500ml	60分
血管確保 1日かけて1000ml以上の 水分を取ってください。			
		生食500ml	60分
生食100ml デキサート3．3mg2AP	30分で	グラニセトロン3mg デキサート3．3mg3AP	30分で アプレピタントカプセルを服用（3日間）
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で	生食500ml 10%塩化ナトリウム シスプラチン	120分で
生食100ml	流し	フロセミド20mg0．5AP	静注
ヘパリンロック		生食500ml	120分で
1日目，8日目		生食500ml	120分で
		生食500ml	120分で

ゲムシタビン(day1，8，15)(1000mg/㎡)＋シスプラチン（day1）（70mg/㎡） short hydration

28日周期

1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml	
グラニセトロン3mg ホスアプレピタント デキサート9．9mg	day2～4：デカドロン服用 30分で
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で
生食500ml 硫酸マグネシウム	60～90分で
生食500ml シスプラチン	90分で
生食50ml フロセミド10mg	全開で（5分くらいで）
生食250ml	55分くらいで
生食500ml	90分で

CDDP投与後の排尿確認　　帰宅後500ml程度の水分を

day2，3：1日かけて1500ml程度の飲水を

8日目、15日目

生食100ml	
生食100ml デキサート6．6mg	30分で
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で
生食100ml	

ゲムシタビン(day1，8)(1000mg/㎡)＋シスプラチン（day1）（70mg/㎡） short hydration

21日周期

1日目

朝より開始前に500mlの水分を

生食100ml	
グラニセトロン3mg ホスアプレピタント デキサート9．9mg	day2～4：デカドロン服用 30分で
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で
生食500ml 硫酸マグネシウム	60～90分で
生食500ml シスプラチン	90分で
生食50ml フロセミド10mg	全開で（5分くらいで）
生食250ml	55分くらいで
生食500ml	90分で

CDDP投与後の排尿確認　　帰宅後500ml程度の水分を

day2，3：1日かけて1500ml程度の飲水を

8日目

生食100ml	
生食100ml デキサート6．6mg	30分で
5%ブドウ糖液100ml ゲムシタビン	30分で
生食100ml	